

W33a1**Pflanzenarmer Kiefern-Buchen-Schattwald****360****Gebiet: Nordostdeutsches Tiefland**

	FW*	Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha				Vorrat an neugebildeter äsbarer Pflanzenmasse in kg TS/ha					Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha		
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Moehringie		0	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0
Eberesche		0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Buche		0	0	0	0	2	3	3	2	2	1	0	0
Draht-Schmiele	9	1	1	1	1	3	6	6	5	4	1	1	1
*** Pilze		0	0	0	0	1	1	1	5	5	2	0	0
*** Bucheckern		25									50	50	25
Eichen		1	1	1	1	4	5	5	4	4	1	1	1
Summe* **		28	3	3	3	12	17	17	19	17	56	53	28

* Futterwert für Damwild

** Werte kg TS/ha gerundet dargestellt; Summe der realen Werte gerundet dargestellt

*** Mindestwerte

Deckungsstufe:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Nachtdeckungsstufe	8												
Winteräsungs-Nutzvorrat in kg TS/ha:	28				Winteräsungs-Bonität: IV								