

| Art | Faktoren | Effekt | Schätzung ± Standardfehler | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|
| Steinhuhn | Achsenabschnitt | | -1.89 ± 0.47 | |
| | Jahr | starke Zunahme | 7.14 ± 2.23 | ** |
| | Höhenmeter | Zunahme | 6.25 ± 2.57 | * |
| Wendehals | Achsenabschnitt | | -0.36 ± 0.22 | |
| | Jahr | | 4.68 ± 1.44 | ** |
| | Jahr ² | Maximum nach 8 Jahren | -5.99 ± 1.26 | *** |
| Baumpieper | Achsenabschnitt | | 0.85 ± 0.19 | |
| | Jahr | | 0.50 ± 0.64 | |
| | Jahr ² | Maximum nach 7 Jahren | -1.38 ± 0.64 | * |
| | Höhenmeter | sehr starke Zunahme | 4.83 ± 1.46 | *** |
| Hausrotschwanz | Achsenabschnitt | | 0.01 ± 0.25 | |
| | Jahr | starke Abnahme | -3.71 ± 1.00 | ** |
| Gartenrotschwanz | Achsenabschnitt | | 1.92 ± 0.08 | |
| | Jahr | | -0.49 ± 0.41 | |
| | Jahr ² | Maximum nach 6 Jahren | -1.04 ± 0.39 | ** |
| Steinrötel | Achsenabschnitt | | -0.49 ± 0.22 | |
| | Jahr | Abnahme | -2.87 ± 1.33 | * |
| Mönchsgrasmücke | Achsenabschnitt | | 0.08 ± 0.17 | |
| | Jahr | | -2.72 ± 1.18 | * |
| | Jahr ² | Maximum nach 6 Jahren | -4.95 ± 1.06 | *** |
| | Höhenmeter | starke Abnahme | -3.50 ± 1.10 | ** |
| Berglaubsänger | Achsenabschnitt | | -0.29 ± 0.25 | |
| | Jahr | sehr starke Zunahme | 7.44 ± 0.90 | *** |
| | Höhenmeter | starke Abnahme | -4.68 ± 1.77 | ** |
| Zilpzalp | Achsenabschnitt | | -2.04 ± 0.52 | |
| | Jahr | Zunahme | 4.89 ± 2.05 | * |
| | Höhenmeter | schwache Abnahme | -6.34 ± 3.47 | • |
| Amsel | Achsenabschnitt | | 0.32 ± 0.16 | |
| | Jahr | starke Zunahme | 2.07 ± 0.78 | ** |
| | Höhenmeter | schwache Abnahme | -2.28 ± 1.24 | • |
| Waldbaumläufer | Achsenabschnitt | | -0.87 ± 0.26 | |
| | Jahr | sehr starke Abnahme | -6.07 ± 1.59 | *** |
| | Höhenmeter | | -1.22 ± 1.87 | |
| | Höhenmeter ² | Maximum bei 1500 m ü. M. | -4.29 ± 1.77 | * |
| Kohlmeise | Achsenabschnitt | | -0.24 ± 0.22 | |
| | Jahr | | 5.68 ± 1.08 | *** |
| | Jahr ² | Plateau nach 10 Jahren | -2.01 ± 0.87 | * |
| | Höhenmeter | sehr starke Abnahme | -6.18 ± 1.55 | *** |
| Zaunkönig | Achsenabschnitt | | 0.39 ± 0.13 | |
| | Jahr | | -5.13 ± 1.16 | *** |
| | Jahr ² | Maximum nach 5 Jahren | -2.39 ± 0.95 | * |
| | Höhenmeter | sehr starke Zunahme | 4.72 ± 0.82 | *** |
| Heckenbraunelle | Achsenabschnitt | | -0.58 ± 0.25 | |
| | Jahr | sehr starke Abnahme | -4.17 ± 1.22 | *** |
| | Höhenmeter | | 5.32 ± 1.90 | ** |
| | Höhenmeter ² | Maximum bei 1600 m ü. M. | -5.91 ± 2.05 | ** |
| Buchfink | Achsenabschnitt | | 0.88 ± 0.09 | |
| | Jahr | starke Abnahme | -1.86 ± 0.68 | ** |
| | Höhenmeter | sehr starke Zunahme | 3.41 ± 0.71 | *** |
| Girlitz | Achsenabschnitt | | -1.54 ± 0.38 | |
| | Jahr | sehr starke Abnahme | -8.52 ± 1.71 | *** |
| | Höhenmeter | sehr starke Abnahme | -9.94 ± 2.48 | *** |
| Zippammer | Achsenabschnitt | | 1.62 ± 0.11 | |
| | Jahr | | 0.27 ± 0.42 | |
| | Jahr ² | Maximum nach 7 Jahren | -0.86 ± 0.40 | * |
| | Höhenmeter | sehr starke Abnahme | -3.92 ± 0.86 | *** |
| Gesamtabundanz | Achsenabschnitt | | 3.74 ± 0.07 | |
| | Jahr | | 0.60 ± 0.16 | *** |
| | Jahr ² | Maximum nach 7 Jahren | -0.84 ± 0.15 | *** |

Tab 2 Resultate der Artmodelle mit der Anzahl Jahre seit dem Waldbrand und der mittleren Höhenlage des Transekts als erklärenden Variablen. Es sind nur diejenigen Arten aufgeführt, für die Jahreseffekte gefunden wurden. Signifikanzniveaus: *** 0.001, ** 0.01, * 0.05, • 0.1.